

Seminar: Formale Begriffsanalyse bereinigte und reduzierte Kontexte

Dozentin: Wiebke Petersen
petersew@uni-duesseldorf.de
SoSe 2010

5. Foliensatz

Wiederholung: Merkmal- und Gegenstandsbegriffe

Definition 1. Für einen Gegenstand $g \in G$ schreiben wir g' statt $\{g\}'$ für den **Gegenstandsinhalt**.

Für ein Merkmal $m \in M$ schreiben wir m' statt $\{m\}'$ für den **Merkmalumfang**.

Ferner schreiben wir γg für den **Gegenstandsbegriff** (g'', g') und μm für den **Merkmalbegriff** (m', m'') .

Bemerkung: Der **Merkmalbegriff** $\mu(m)$, assoziiert mit dem Merkmal m , ist der größte Begriff, dessen Intension m enthält; analog ist der **Gegenstandsbegriff** $\gamma(g)$ zum Gegenstand g der kleinste Begriff, dessen Extension g enthält.

In Begriffsverbänden werden i.d.R. nur die Gegenstands- und Merkmalbegriffe beschriftet.

Wiederholung: Hauptsatz der Formalen Begriffsanalyse

Theorem 2. [Hauptsatz der Formalen Begriffsanalyse] Für jeden formalen Kontext (G, M, I) bildet die assoziierte geordnete Menge $(\mathcal{B}(G, M, I), \leq)$ einen vollständigen Verband. In dem Verband sind Infimum und Supremum wie folgt beschrieben:

$$\bigwedge_{t \in T} (A_t, B_t) = \left(\bigcap_{t \in T} A_t, \left(\bigcup_{t \in T} B_t \right)'' \right)$$

$$\bigvee_{t \in T} (A_t, B_t) = \left(\left(\bigcup_{t \in T} A_t \right)'', \bigcap_{t \in T} B_t \right)$$

Jeder vollständige Verband ist ein formaler Begriffsverband zu einem formalen Kontext.

Wiederholung: Hauptsatz der Formalen Begriffsanalyse

Proposition 3. Jeder formale Begriff (A, B) eines formalen Kontextes (G, M, I) ist das Supremum der Gegenstandsbegriffe seines Umfangs


$$(A, B) = \bigvee_{g \in A} (g'', g')$$

und das Infimum der Merkmalbegriffe seines Inhalts

$$(A, B) = \bigwedge_{m \in B} (m', m'').$$

kleiner Verwandtschaftskontext

	direkt verwandt	älter	jünger	männlich	weiblich	andere Generation
Vater	×	×		×		×
Mutter	×	×			×	×
Bruder	×			×		
Schwester	×				×	
Kind	×		×			×
Sohn	×		×	×		×
Tochter	×		×		×	×
Papa	×	×		×		×
Mama	×	×			×	×



Betrachte: $\gamma_{\text{Vater}} \vee \gamma_{\text{Tochter}}$ und $\mu_{\text{jünger}} \wedge \mu_{\text{älter}}$


bereinigte Kontexte

Definition 4. Ein Kontext (G, M, I) heißt *bereinigt*, wenn für beliebige Gegenstände $g, h \in G$ aus $g' = h'$ stets $g = h$ folgt und wenn für beliebige Merkmale $m, n \in M$ aus $m' = n'$ stets $m = n$ folgt.

Bemerkung: Man bereinigt einen Kontext, indem man alle Zeilen streicht, deren Kreuzteil identisch zu einer anderen Zeile ist; das gleiche macht man mit allen "doppelt" vorkommenden Spalten. Der Begriffsverband des bereinigten Kontextes ist strukturgleich zu dem des Ursprungskontextes.

kleiner Verwandtschaftskontext

	direkt verwandt	älter	jünger	männlich	weiblich	andere Generation
Vater	×	×		×		×
Mutter	×	×			×	×
Bruder	×			×		
Schwester	×				×	
Kind	×		×			×
Sohn	×		×	×		×
Tochter	×		×		×	×
Papa	×	×		×		×
Mama	×	×			×	×



irreduzible Elemente eines Verbands

Bemerkung: Ein Element eines Verbands heißt \vee -irreduzibel, wenn es *nicht* das Supremum einer Menge von echt kleineren Elementen ist.

Ein Element eines Verbands heißt \wedge -irreduzibel, wenn es *nicht* das Infimum einer Menge von echt größeren Elementen ist.

reduzierte Kontexte


Definition 5. Ein bereinigter Kontext (G, M, I) heißt *zeilenreduziert*, wenn jeder Gegenstandsbegriff \vee -irreduzibel ist, und *spaltenreduziert*, wenn jeder Merkmalsbegriff \wedge -irreduzibel ist. Ein Kontext der sowohl zeilen- als auch spaltenreduziert ist, ist *reduziert*.

Bemerkung: Man reduziert einen Kontext (G, M, I) , indem man alle Gegenstände streicht, deren Begriffe im Begriffsverband nicht genau einen unteren Nachbarn haben und indem man alle Merkmale streicht, deren Begriffe im Begriffsverband nicht genau einen oberen Nachbarn haben.

Der Begriffsverband des reduzierten Kontextes ist strukturgleich zu dem des Ursprungskontextes.

kleiner Verwandtschaftskontext

	direkt verwandt	älter	jünger	männlich	weiblich	andere Generation
Vater	x	x		x		x
Mutter	x	x			x	x
Bruder	x			x		
Schwester	x				x	
Kind	x		x			x
Sohn	x		x	x		x
Tochter	x		x		x	x
Papa	x	x		x		x
Mama	x	x			x	x



Übungsaufgaben

1. Warum genügt es im Begriffsverband die Gegenstands- und Merkmalbegriffe zu beschriften? Warum kann man aus diesen die Begriffsinhalte und -umfänge ablesen?
2. Warum sind gerade die Gegenstände, deren Gegenstandsbegriffe mehr als einen unteren Nachbarn im Begriffsverband haben, reduzibel?

Implikationen zwischen Merkmalen

Definition 6. Sei (G, M, I) ein formaler Kontext. Eine Implikation zwischen Merkmalen (in M) — kurz eine **Merkmalsimplikation** — ist ein Paar von Teilmengen der Merkmalmenge M ; bezeichnet wird eine solche Implikation mit $A \rightarrow B$.

Terminologie

Definition 7. Eine Teilmenge $T \subseteq M$ **respektiert** eine Implikation $A \rightarrow B$, wenn $A \not\subseteq T$ oder $B \subseteq T$ ist. T respektiert eine Menge \mathcal{L} von Implikationen, wenn T jede einzelne Implikation in \mathcal{L} respektiert.

Eine Merkmalsimplikation $A \rightarrow B$ **gilt** in einem formalen Kontext (G, M, I) , wenn $A, B \subseteq M$ und wenn jeder Gegenstandsinhalt die Implikation respektiert. Wir sagen dann auch, $A \rightarrow B$ ist eine **Implikation des Kontextes** (G, M, I) oder, gleichbedeutend, im Kontext (G, M, I) ist A eine **Prämisse** für B . B wird dann auch die **Konklusion** der Implikation $A \rightarrow B$ genannt.

abgeschlossene und vollständige Implikationsfamilien


Definition 8. Eine Implikation $A \rightarrow B$ **folgt (semantisch)** aus einer Menge \mathcal{L} von Implikationen zwischen Merkmalen in M , falls jede Teilmenge von M , die \mathcal{L} respektiert, auch $A \rightarrow B$ respektiert. Eine Implikationsfamilie \mathcal{L} wird **abgeschlossen** genannt, wenn jede Implikation, die aus \mathcal{L} folgt, schon zu \mathcal{L} gehört.

Eine Menge \mathcal{L} von Implikationen eines Kontextes (G, M, I) heißt **vollständig**, wenn jede Implikation von (G, M, I) aus \mathcal{L} folgt.

Basis der Merkmalsimplikationen

Definition 9. Eine Menge \mathcal{L} von Implikationen eines Kontextes (G, M, I) heißt **nichtredundant**, wenn keine der Implikationen aus den übrigen folgt.

Eine Menge \mathcal{L} von Implikationen eines Kontextes (G, M, I) , die nichtredundant und vollständig ist, heißt **Basis der Merkmalsimplikationen**.



$\{\text{eindeutig}\} \rightarrow \{\text{direkt verwandt, älter}\}$

$\{\text{direkt verwandt, älter}\} \rightarrow \{\text{eindeutig}\}$

$\{\text{jünger}\} \rightarrow \{\text{andere Generation}\}$

$\{\text{älter}\} \rightarrow \{\text{andere Generation}\}$

$\{\text{älter, jünger}\} \rightarrow \{\text{männlich, weiblich, eindeutig}\}$

$\{\text{männlich, weiblich}\} \rightarrow \{\text{älter, jünger, eindeutig}\}$

Hausaufgabe

1. Beschreiben Sie, wie man aus einem Begriffsverband die Menge der Merkmalsimplikationen ablesen kann.
2. Konstruieren Sie einen kleinen formalen Kontext zu Tieren (mindestens 4 Gegenstände und 4 Merkmale) und geben Sie alle Merkmalsimplikationen an, die in ihrem Kontext gelten.